


Rosetsvampe m.fl.

Gruppen består af vifte- til rosetformede eller foldede frugtleger med et ± glat hymenium på undersiden/ ydersiden. Oversiden/undersiden er i reglen steril. Frugtlegerne er oftest ret seje og varierer fra meget store hos blomkålssvamp (*Sparassis*) til små hos mostunge (*Muscinupta*). Gruppen er en formgruppe af ikke nært beslægtede arter. Frynsesvampene (*Thelephora*) danner ektomykorrhiza, resten af arterne er formodede nedbrydere (evt. nekrotrofer) eller mos-parasitter.

- LIGNENDE GRUPPER:
- de knippeformede poresvampe har altid porer på undersiden; se s. xxx.
 - hatdannende lædersvampe er seje og oftest bredt tilvoksede og ikke stilkede; se s. 625 xxx.
 - østershatte med reducerede lameller (fx spatelhat (*Gloiocephala*) og fontænehat (*Arrhenia*)) danner blødkødede frugtleger, som ofte har året sporebærende lag; se s. 54 xxx.
 - hængeskåle danner normalt ikke stok; se s. 712 xxx.
 - afladede kølleformede sæksvampe er blødkødede med hymenium på begge sider og sporerne dannes i sække; se Nordeuropas Svampe bind 2.

Mikrotegninger: sporer yderst, derefter cystider. øs. = øskner.



frynsesvamp
(*Thelephora*)
6 arter,
pkt. 12

rosetsvamp
(*Podoscypa*)
ej DK, pkt. 2

navlesvamp
(*Cotylidia*)
3 arter, pkt. 9

stilkældevsvamp
(*Stereopsis*)
2 arter, pkt. 7

lædersvamp
(*Stereum*),
se s. 625 xxx

mostunge
(*Muscinupta*)
1 art, pkt. 6

hængeskåle
s. 712 xxx

østershatte m.fl. uden lameller
s. 54 xxx

knippeformede poresvampe
s. 572 xxx

hatdannende barksvampe (lædersvampe)
s. 620 xxx

blomkålssvamp
(*Sparassis*)
1 art,
pkt. 3

rosetsvampe
danner vifte- til rosetformede eller foldede frugtleger med hymeniet på en ± glat under/yderside

lignende grupper

± seje

± skøre og blødkødede

mellemstore med brunt kød, brune hyfer og brune, vortede sporer

mellemstore til små med hvidt kød og talrige, ofte langt udragende cystider

lille med hvidt kød, hvide til gule farver og meget små sporer

mellemstore med sejt kød og tykvæggede cystider

lille og spatelformet; med udragende cystider; på mosser

med skelethyfer

stor med mange rosetter; med oleicystider og skelethyfer

meget stor med talrige folder eller „blade“; uden skelethyfer

