Slimslør m.fl.

Gruppen omfatter lamelsvampe med mørkebrunt til sort sporestøv og langt nedløbende lameller. De to slægter af slimslør (*Chroogomphus* og *Gomphidius*) har et trådet-slimet universalsvøb, der dækker hele det unge frugtlegeme - mest slimet hos *Gomphideus*. De er beslægtet med slimrørhattene og har typiske, tenformede sporer. Slægten sørgehat (*Melanomphalia*) tilhører champignonordenen. Sørgehat har fint prikket-vortede sporer.

Arterne af slimslør er sandsynligvis parasitter på ektomykorrhizasvampe med nåletræer (slimrørhatte (*Suillus*) og skægtrøfler (*Rhizopogon*)), mens sørgehat er en nedbryder.

Lignende grupper:
– netbladhat (*Paxillus*) og lamelrørhat (*Phylloporus*) har brunt sporestøv; se s. xxx.
– viftesvampe (*Tapinella*) har brunt sporestøv og randstillet eller manglende stok og vokser på ved; se s. xxx.



Nøgle til slimslør m.fl.

1. Stok 2-4 mm tyk, sortnende nedefter; uden svøb; sporer fint vortede. Sporer 9-12 x 5-7,5 µm; på jord i kalkbrud, på kirkegårde eller andre byhabitater; meget sjælden, østlig . . . . . **sørgehat (*Melanomphalia nigrescens*)**
   Stok tykkere, ikke sortnende; med trådet eller slimet svøb; sporer glatte . . 2

2. Slør dannet af slim; hat træbrun, grå til grårosa (🍄 ■■■■■) . . . . . [slimslør – *Gomphidius*] . . 3
   Slør mest trådet; hat grårosa, brunrosa, kanelbrun til gulbrun (🍄 ■■■■■) . . . . . [slimslør – *Chroogomphus*] . . 5

3. Hat grårosa (🍄 ■). Hat 20-50 mm bred; sporer 17-20 x 5-5,5 µm; med fyr og grovporet slimrørhat (*Suillus bovinus*) i sandede plantager; hist og her, sjælden mod sydøst . . . . . **rosenrød slimslør (*Gomphidius roseus*)**
   Hat træbrun til ± grå (🍄 ■■■■), eventuelt rødmende ved berøring . 4

4. Stedvist rødmende ved berøring, derefter sort; hat 26-60 mm bred; med lærk. Sporer 17-23 x 6-8 µm; muligvis en parasit på myceliet af lærke-slimrørhat (*Suillus grevillei*); sjælden og ikke vest for israndslinjen . . . . . **rødmende slimslør (*Gomphidius maculatus*)**
   Uden farveskift ved berøring; hat 40-130 mm bred; kød gult i stokbasis; med gran (og fyr?). Sporer 17-20 x 5,5-6,5 µm; ret almindelig, sjældnere mod syd . . . . . **grå slimslør (*Gomphidius glutinosus*)**

5. Lamelkød ikke amyloidt eller højst med meget få amyloide hyfer 6
   Lamelkød tydeligt amyloidt (ses let makroskopisk) 7

6. Hat fedtet (kysse-positiv); hatkødhyfer gelatiniserede. Hat 30-70 mm bred; lameller ret fjerne; sporer 15-18,5 x 6-7,5 µm, gns. 16,9 x 6,6 µm, Q-gns. 2,4-2,7; med fyr eller parasit på slimrørhatte eller skægtrøfler; ej DK . . . . . ***Chroogomphus mediterraneus***
   Hat tør; hatkødhyfer ikke gelatiniserede. Hat 30-50 mm bred; lameller mellemtætte; sporer 15-19 (-20) × 6-7,5 µm, Q ca. 2,6; med fyr, typisk 5-nålede arter, eventuelt parasit på *Suillus plorans* eller *S. sibiricus*; ej DK . . . . . ***Chroogomphus helveticus***

7. Stok ± glat; lameller ret fjerne (30 til 40 gennemgående lameller); frugtlegemer smalle og langstokkede. Hat 10-45 mm bred; sporer 18-23,5 x 6,5-8 µm, gns. 20,3 x 7,1 µm, Q-gns. 2,8-3,0; basalmycelie i mikroskopet med ret grove, amyloide korn; cystider tenformede eller med lidt udvidet top; med fyr, men parasit på slimrørhatte, formodentlig broget slimrørhat (*Suillus variegatus*); hist og her . . . . . **slank slimslør (*Chroogomphus britannicus*)**
   Stok oftest med rosa til rosabrune bælter af slørrester; lameller mest middeltætte til tætte (over 40 gennemgående lameller); frugtlegemer ofte relativt robuste 8

8. Sporer 15-18 x 5-6,5 µm, gns. 16,6 x 5,7 µm. Hat 20-50 mm bred; spore-Q-gns. 2,8-3,0; basalmycelie med amyloide korn; med fyr, parasit på slimrørhatte; meget sjælden eller overset . . . . . **purpurflammet slimslør (*Chroogomphus purpurascens*)**
   Sporer i gns. større end 16,6 x 5,7 µm 9

9. Nogle æg- og fladecystider tykvæggede (væg 1,5-3 µm). Hat 20-90 mm bred; lameller ret tætte; sporer 16-21,5 x 5,5-7 µm, gns. 16,7-20,5 x 5,9-6,4 µm, Q-gns. 2,7-3,5; med fyr, men nok parasit på kornet slimrørhat (*Suillus granulatus*); hist og her . . . . . **brunrød slimslør (*Chroogomphus rutilus*)**
   Æg- og fladecystider relativt tyndvæggede (væg til 1 (-1,5) µm tyk), men kan synes tykvægget på grund af en stor, indre dråbe 10

10. Spore-Q-gns. 2,3-3,1; cystider over 15 µm brede. Hat 40-80 mm bred; stok med rødlige pletter mod basis; sporer 17-24 x 7-8 µm, gns. 20,6 x 7 µm; med fyr, men parasit på slimrørhatte; ej DK . . . . . ***Chroogomphus subfulmineus***
    Spore-Q-gns. 3,1-3,4; cystider under 15 µm brede. Hat 10-45 mm bred; stok med rødlige pletter mod basis; sporer 19-24 x 6-7 µm, gns. 21,2 x 6,5 µm; med fyr, parasit på slimrørhatte eller skægtrøfler; ej DK . . . . . ***Chroogomphus fulmineus***